


FJERNELSE AF GALDEBLÆRE



INDLEDNING

Galdesten dannes i galdeblæren. Stenenes tilstedeværelse kan give anledning til galdestenskolik med smerter under højre ribbenskant, eventuelt med udstråling til ryggen. I forbindelse med koliktilfældet kan der være kvalme og opkastninger.

Galdesten kan give komplikationer i form af galdeblærebetændelse. Derudover kan de også give anledning til stop i galdegang-

ene med efterfølgende udvikling af gulsot og risiko for betændelse i galdegangene og leveren. Galdesten kan også give betændelse i bugspytkirtlen, da bugspytkirtel og galdeblære har samme udførselsgange i tolvfingertarmen.

Behandling af gentagne tilfælde af galdestenssmerter er oftest operation med fjernelse af galdeblæren med stenene.

FORUNDERSØGELSE

Ved forundersøgelsen foretager kirurgen en klinisk undersøgelse. Såfremt ultralydsskanning ikke er foretaget, vil kirurgen iværksætte dette, da galdeblæresten skal kunne påvises inden eventuel operation. Der skal endvidere foretages blodprøver for at undersøge leverens funktion.

OPERATION

Før operationen påbegyndes, gives en indsprøjtning som forebyggelse mod blodpropper og antibiotika som forebyggelse mod infektion. Operationen foregår i fuld bedøvelse og varer ca. 1 time.

Der lægges 4 små snit på ca. 0,5-1 cm. Her igennem indføres 4 små rør, som operationen foretages gennem. Galdeblæren med stenene frilægges og fjernes, og de 4 små snit lukkes med nylontråd, hvorpå der sættes 4 plastre.

Forskellige forhold kan vanskeliggøre operationen, således at den ikke kan gennemføres som kikkertoperation (færre end 5 %). Det kan f.eks. være tidligere operation eller svær betændelse omkring galdeblæren. I disse tilfælde kan det være nødvendigt at anvende et større operationssnit under højre ribbenskant. Dette kan medføre forlænget indlæggelse pga. øget tendens til smerter, kvalme og opkastninger.

EFTER OPERATIONEN

Du kan efter operationen have smerter i maven, hovedsageligt svarende til de 4 små snit og mest udtalt til såret ved navlen. Nogle patienter får også smerter under højre

ribbenskant eller i skulderen. Smerterne kan behandles med let smertestillende medicin, som du anbefales at tage de følgende 3 døgn.

Fjernelse af galdeblæren giver ikke ændringer i fordøjelsen, og du må spise, hvad du har lyst til efter operationen.

Udskrivelse

Du kan udskrives samme dag eller dagen efter.

Trådfjernelse

Trådene fjernes efter ca. 10 dage på Capiro CFR eller hos egen læge.

Arbejde og vanlige aktiviteter

Det er normalt at føle sig træt i den første tid efter operationen, men arbejde kan uden risiko genoptages efter 2 døgn.

Lettere sport og vanlige aktiviteter kan genoptages, så snart du føler dig klar til det.

MULIGE KOMPLIKATIONER

Blødning

Ses sjældent, men kræver fornyet operation i fuld bedøvelse.

Infektion

Der ses oftest betændelse i såret ved navlen. Betændelsen behandles med rensning af såret. Er der tale om dybere infektion behandles med antibiotika.

Beskadigelse af galdegangen

Forekommer hos ca. 0,5 % og behandles kirurgisk.

Ring til Capiro CFR hvis:

- Smerterne tiltager
- Du får feber
- Du oplever rødme, hævelse og dunkende smerter ved operationssårene
- Du bliver gul i øjne eller på huden

KONTAKT

Er der noget, du er i tvivl om, eller har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til Capiro CFR.

Lyngby: 3977 7070

Odense: 6548 7070

Aarhus: 8612 1186

Skørping: 9839 2244

Viborg: 8725 0899

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

info@capiocfr.dk

www.capiocfr.dk



○ **Hellerup**
Hans Bekkevolds Allé 2B
2900 Hellerup
Tlf.: 3977 7070

○ **Odense**
Pantheonsgade 25
5000 Odense C
Tlf.: 6548 7070

○ **Lyngby**
Jægersborgvej 64-66B
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 3977 7070

○ **Skørping**
Himmerlandsvej 36
9520 Skørping
Tlf.: 9839 2244

○ **Aarhus**
Margrethepladsen 3
8000 Aarhus C
Tlf.: 8612 1186

○ **Viborg**
Stadion Allé 7
8800 Viborg
Tlf.: 8725 0899

info@capiocfr.dk • capiocfr.dk

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00