


GRÅ STÆR




CFR hospitaler

Hellerup 3977 7070 | Lyngby 3977 7070 | Odense 6548 7070 | Skørping 9839 2244
info@cfrhospitaler.dk - www.cfrhospitaler.dk

INDLEDNING

Grå stær er en tilstand hvor øjets biologiske linse bliver uklar. Sædvanligvis er det forbundet med høj alder, men kan dog forekomme i alle aldre og endda være medfødt. Grå stær kan optræde hyppigere ved visse almene sygdomme, samt i forbindelse med medicinsk behandling af disse.

Behandling for grå stær er kirurgisk og foregår i dråbe-bedøvelse (det vil sige INGEN injektion).

Resultatet efter en grå stær operation er i langt de fleste tilfælde godt. Hvis øjnene fejler andet end grå stær, er det noget vanskeligere at forudsige resultatet. For at få det optimale udbytte af en operation skal man efterfølgende påregne at bruge briller både til afstand og læsning. Disse kan udmåles efter ca. 4-5 uger.

FØR OPERATIONEN

Forundersøgelse finder sted 1-2 uger før operationen. Her gives recept på de dråber du skal bruge efter operationen. Det er tilrådeligt at købe dem, således at de er i hjemmet når du kommer hjem fra operation.

BEDØVELSE

Dråbebedøvelse, ingen injektion. Beroligende tablet kan gives ved behov.

OPERATIONEN

Du ligger på et operationsleje, øje og øjenomgivelser renses og der placeres en afdækning over hovedet. En lille klemme sørger for at øjet er åbent under operationen. Den generer mindst hvis du undlader at knibe øjnene i. Der vil være en del svien, men ingen egentlige smerter. Der bliver skyllet med en del vand.

Der lægges et lille snit på et par mm i øjet, og igenem dette fjernes uklarhederne i øjets linse ved

hjælp af ultralyd (phacoemulsification). I den del af den biologiske linse som efterlades, placeres en kunstig linse. Den kunstige linse holder hele livet, men den tilbageværende del af den biologiske linse, kan i nogle tilfælde blive uklar (efterstær).

EFTER OPERATIONEN

Der er ikke behov for forbindelse. Da pupillen er stor i ca. et døgn efter operationen, vil der være et noget tåget syn samt fornemmelse af en halo omkring lys. Du skal komme til kontrol efter 3 dage samt efter ca. 2 uger. Øjet skal dryppes med dråber i 2-3 uger efter operationen.

Du må ikke spille tennis eller badminton i 2 uger og det er ikke tilladt at gå i svømmebad eller havbad i 2 uger efter operationen.

I de fleste tilfælde er det tilstrækkeligt at være væk fra sit arbejde frem til kontrollen på 3. dag.

SENFØLGER OG EVENTUELLE KOMPLIKATIONER

Som ved alle andre operationer er der også ved grå stær operation en lille risiko for at der kan tilståde komplikationer. Den hyppigste betydende komplikation er en hævelse i den gule plet (Cystoidt Maculaødem). Denne forsvinder i de fleste tilfælde spontant, men kan i sjældne tilfælde betyde, at resultatet bliver dårligere end forventet. Nethindeløsning ses hos mindre end 1% af opererede øjne og kan opstå mange måneder efter en grå stær operation. Dette kræver en operation for at redde synet.

Endelig er der nogle ekstremt sjældne komplikationer i form af svær betændelse i det indre øje og svær blødning bagtil i øjet. Disse komplikationer er potentielt synstruende og vanskelige at behandle.

