

OPERATION VED SKEDEINDGANG OG YDRE KØNSORGANER



Operation ved skedeindgangen og de ydre kønsorganer foretages, når der er påvist celleforandringer eller ved kroniske gener i området. Celleforandringer skyldes i de

fleste tilfælde en langvarig infektion med human papillomavirus (HPV). Kroniske gener kan være betinget af hudsygdom, infektion eller fødselsskade.

FØR OPERATIONEN

Inden operationen bliver du tilbudt en forundersøgelse for at afklare problemets omfang. Ved mistanke om celleforandringer tages en vævsprøve (biopsi) for at vurdere forandringernes sværhedsgrad.

Operationen foregår i fuld bedøvelse og varer normalt 20-30 minutter. Se separat patientinformation om fuld bedøvelse.

OPERATIONEN

Ved operationen fjernes det syge eller forandrede hud og slimhinde. Indgrebets størrelse afhænger således af forandringernes udbredelse. Såret lukkes efterfølgende med selvopløselig tråd.

I tilfælde af celleforandringer sendes det fjernede væv til mikroskopisk undersøgelse. Her undersøges det, om forandringerne er fjernet i sundt væv (om kanten består af sundt væv).

EFTER OPERATIONEN

Ved operation tæt på urinrøret lægges kateter i blæren. Kateteret fjernes 2 timer efter operationen.

Der kan være svie og smerter i såret de første dage efter operationen. Vi anbefaler, at du

indtager de tilbudte smertestillende tabletter.

Udskrivelsen finder sted samme aften eller næste dag. Hvis du udskrives samme dag, må du ikke selv køre bil hjem, og du skal være under voksent opsyn det første døgn. Inden hjemsendelsen orienterer kirurgen dig om operationen og om, hvordan du skal forholde dig efter udskrivelsen.

MULIGE KOMPLIKATIONER

Der er tale om en lille operation, og alvorlige komplikationer er derfor sjældne. Der kan dog opstå overfladisk infektion i såret. Blærebetændelse, som kræver antibiotisk behandling, ses også, hvis du har haft kateter.

FORHOLDSREGLER

Hvis du i tiden efter operationen oplever:

- tiltagende smerter i såret
- feber over 38 grader

skal du kontakte Capiro CFR, egen læge eller lægevagten i din region (akuttelefonen 1813, hvis du bor i Region H).

Såret skal holdes så rent og tørt som muligt. Du skal vaske med vand og sæbe 2 gange dagligt, specielt i forbindelse med toiletbesøg. Skyl med håndbruser og tør forsigtigt.



Såret heler i løbet af 2-3 uger, og i denne periode fraråder vi samleje og besøg i svømmehal.

Spis sundt og varieret og hold om nødvendigt tarmen i gang med HUSK eller Magnesia 500 mg, 2 tabletter 1-2 gange dagligt.

Sygemelding

Det vil være individuelt, hvornår du kan genoptage dit arbejde, men sædvanligvis efter et par dage til 1 uge.

KONTROL

Du får en tid til ambulant kontrol af såret en uge efter operationen. Hvis trådene strammer, kan man her vælge at fjerne nogle af dem.

SVAR

Inden du går hjem, aftaler du med gynækologen, hvordan du får svar, hvis der er sendt væv til mikroskopisk undersøgelse. I de fleste tilfælde vil svaret foreligge, når du møder til kontrol efter en uge.

KONTAKT

Er der noget, du er i tvivl om, eller har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til Capio CFR.

Lyngby: 3977 7070

Odense: 6548 7070

Aarhus: 8612 1186

Skørping: 9839 2244

Viborg: 8725 0899

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

info@capiocfr.dk

www.capiocfr.dk



○ **Hellerup**
Hans Bekkevolds Allé 2B
2900 Hellerup
Tlf.: 3977 7070

○ **Lyngby**
Jægersborgvej 64-66B
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 3977 7070

○ **Aarhus**
Margrethepladsen 3
8000 Aarhus C
Tlf.: 8612 1186

○ **Odense**
Pantheonsgade 25
5000 Odense C
Tlf.: 6548 7070

○ **Skørping**
Himmerlandsvej 36
9520 Skørping
Tlf.: 9839 2244

○ **Viborg**
Stadion Allé 7
8800 Viborg
Tlf.: 8725 0899

info@capiocfr.dk • capiocfr.dk

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag 8.00-16.00