

PROVOKERET ABORT - KIRURGISK INDGREB



PROVOKERET ABORT

Ifølge gældende lovgivning kan der udføres provokeret abort før udgangen af 11. graviditetsuge. Provokeret abort kan foregå enten som medicinsk abort eller kirur-

gisk ved en udskrabning/udsugning af livmoderhulen. Medicinsk abort anbefales især før 9. graviditetsuge, mens kirurgisk abort ofte foretrækkes fra 9. til 11 fulde uger.

FØR OPERATIONEN

I forbindelse med forundersøgelsen foretages gynækologisk undersøgelse med ultralydsscanning til bestemmelse af graviditetslængden. Sammen med gynækologen beslutter du, hvilken metode der er bedst egnet for dig. Anmodning om svangerskabsafbrydelse underskrives.

OPERATIONEN

Udskrabningen foretages i fuld bedøvelse, og der gives medicin, som trækker livmoderen sammen. Lægen udvider livmoderhalsen og fører et plastrør ind i livmoderen. Derefter bliver graviditeten suget ud. Hele indgrebet tager cirka 10 minutter.

EFTER OPERATIONEN

Efter indgrebet køres du til sengeafsnittet, hvor du overvåges, indtil du er klar til at blive afhentet - normalt efter få timer. Når du har været i fuld bedøvelse, må du ikke selv køre bil hjem, og du skal være under voksens opsyn det første døgn.

Inden hjemsendelsen orienterer kirurgen dig om operationen og den efterfølgende plan. Du får en kopi af journalen udleveret, eller den vil blive sendt til dig efterfølgende, og du får smertestillende medicin med hjem til de første tre dage efter operationen.

Der kan være lette smerter og blødning efter indgrebet. Det er normalt, at du bløder svarende til en normal menstruation i cirka en uge. Derefter vil det aftage, men du skal regne med at bløde i 2-3 uger.

MULIGE KOMPLIKATIONER

Underlivsinfektion eller kraftig blødning kan ses i sjældne tilfælde. En anden sjælden komplikation er, at der under operationen kan gå hul på livmoderen. Denne komplikation kan bevirke, at der skal foretages en kikkertoperation, eller at du må blive på hospi-

talet ½-1 døgn til observation for blødning eller infektion.

FORHOLDSREGLER

Hvis du i tiden efter operationen oplever:

- kraftig blødning
- feber over 38 grader
- kraftige underlivssmerter

skal du kontakte Capiro CFR, egen læge eller lægevagten i din region (akuttelefonen 1813, hvis du bor i Region H).

For at forebygge infektion anbefaler vi, at du, så længe du bløder,:

- undgår ubeskyttet samleje
- undgår karbad, havbad, spa og svømmehal
- anvender hygiejnebind fremfor tamponer

Efter et par dage kan du genoptage dine normale aktiviteter som arbejde, motion og lignende.

KONTAKT

Er der noget, du er i tvivl om, eller har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til Capiro CFR.

Lyngby: 3977 7070

Odense: 6548 7070

Aarhus: 8612 1186

Skørping: 9839 2244

Viborg: 8725 0899

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

info@cfrhospitaller.dk

www.capio CFR.dk

Udarbejdet af Connie Palle
Sidst revideret oktober 2017
Revideres igen 2020